

INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA STYMULATORA WZROSTU „BIOWERM TECHNO”

Zakres stosowania, sposób, terminy oraz dawki stymulatora BIOWERM TECHNO

BIOWERM TECHNO jest organiczno-mineralnym stymulatorem wzrostu produkowanym z wermikompostu. Przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych oraz w uprawach warzywniczych.

Wielkość dawek i terminy stosowania:

Uprawa	Dawka	Termin stosowania	Zalecana ilość wody
Kukurydza	2 l/ha	faza 2-3liścia; faza 6-8liści	200 l
Oleiste , np. : rzepak, słonecznik, len, czarnuszka	2 l/ha	rzepak : jesień: faza 4-5liścia, wiosna: po ruszeniu wegetacji, faza pąkowania; len : faza jodełki (wysokość roślin 8-10cm); faza pąkowania; słonecznik : początek wykształcania kwiatostanu,	200 l
Zbożowe , np. : pszenica, jęczmień, owies, żyto	2 l/ha	faza strzelania w źdźbło; faza liścia flagowego;	200 l
Warzywa , np. : kabaczek, marchew, cebula, rzodkiewka, bakłażan, arbuż, ziemniaki, burak cukrowy, kapusta, brokuł, koper, pietruszka;	2 l/ha	ogólnie: pierwszy raz stosować, gdy roślina ma 3-5 liści; drugie stosowanie 7-15 dni. ziemniak: gdy rośliny osiągną wysokość 15-20cm; początek kwitnienia; burak cukrowy: początek zakrywania międzyrzędzi; 25-30 dni po stosowaniu pierwszy raz;	200 l
Drzewa owocowe , np. : jabłonie, gruszy, śliwy, brzoskwinie, morwa, czereśnie, wiśnie	0,5-1 l/ha	pierwszy raz przed kwitnięciem, drugi raz od razu po przekwitnięciu, trzeci raz od razu po zawiązaniu się plonu	200 l
Jagodowe , truskawki, borówka amerykańska, porzeczka	2 l/ha	po wegetacji; kolejne zastosowanie 5-7 dni po poprzednim zastosowaniu do dojrzewania jagód.	200 l

Sposób sporządzania cieczy roboczej

Przed użyciem przeczytaj etykietę.

Przed użyciem dobrze wstrząśnij butelką.

Napełnij zbiornik roboczy do połowy wodą i rozpocznij mieszanie. Dodaj wymaganą ilość BOWERM TECHNO do zbiornika opryskiwacza, mieszaj aż do rozpuszczenia lub rozproszenia i dodaj pozostałą ilość wody. Upewnij się, że podczas opryskiwania utrzymywane jest mieszanie.

Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą. Po pracy opryskiwacz umyć.

Uwagi

- Nie stosować na glebach zamrzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem oraz podczas opadów deszczu. Za gleby zamrznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia,
- Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin,
- Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać:

- w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu,
- w temperaturze od +5 °C do +15°C,
- z dala od źródeł ciepła, środków utleniających, (mocnych) kwasów
- poza zasięgiem osób nieupoważnionych, dzieci i zwierząt.

Nie przechowywać z żywnością, napojami, paszami i wodą.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania z produktem

Podczas pracy ze stymulatorem należy używać rękawice ochronne, ochronę oczu.

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. W przypadku dostania się do oczu przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia, skontaktować się z lekarzem.

Po pracy umyć ręce wodą z mydłem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Akceptuję treść instrukcji stosowania
w zakresie upraw polowych

20.08.2021

Damian Wach

dr Damian Wach

Institut Uprawy Nawożenia i Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
ZAKŁAD ŻYWIENIA ROŚLIN
I NAWOŻENIA
24-100 Puławy, ul. Czarotoryskich 8
Tel. (81) 47 86 830